



ECHOGRAPHIE T2

Dr Reda LAMZIBRI

Le deuxième trimestre 22 - 28 sa

- >> la croissance (RCIU)
- >> la morphologie (malformations graves ..)
- >> la localisation du placenta (césarienne ! - accouchement)
- >> exploration du degré de risque
 - d'accouchement prématuré (col)
 - GG , RAI + , HTA.. (doppler)

RAPPORT D'ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE

ECHOGRAPHIE DU 2ème TRIMESTRE

Date de l'examen :

Madame :

née le :

Dernières règles corrigées :

ou

début de grossesse estimé :

Terme prévu corrigé :

Age gestationnel :

SA

jours

Indication: dépistage

Anamnèse :

Antécédents personnels ou familiaux :

Présence d'une consanguinité :

Echographie du 1er trimestre : LCC = mm ; CN= mm.

Dépistage d'un risque accru de trisomie 21 par marqueurs sériques : risque = 1/

(α FP = MoM ; β hCG = MoM ; PAPP-A = MoM)

Conditions de l'examen :

Satisfaisantes

Autre :

Examen réalisé par :

Voie abdominale

Voie vaginale

Nombre de fœtus :

Si grossesse multiple chaque fœtus sera décrit séparément ;

Chorionicité :

amnionicité :

Présentation :

Céphalique

Autre :

Dos :

Vitalité fœtale :

Activité cardiaque présente

FC :

/min

Mouvements actifs présents

Biométries (courbes du CFEF) :

BIP : mm >>>> Percentile :

PC : mm >>>> Percentile :

LF : mm >>>> Percentile :

PA : mm >>>> Percentile :

EPF (Hadlock) : grammes >>>> Percentile :

Dopplers (si grossesse gémellaire- si risque d'anémie) :

IR AO:

IR ACM: Vmax : cm/ sec

DUCTUS VEINEUX :

Morphologie :

Crâne :

Contours bien limités et d'aspect habituel

Ligne médiane : aspect habituel

Cavum du septum pellucidum vu ; aspect habituel

Corne occipitale d'un ventricule latéral mesurée à mm

Fosse postérieure : grande citerne et cervelet d'aspect habituel

Autre :

Face :

Lèvre supérieure intègre

Autre :

Cœur :

Situs normal

4 cavités équilibrées 2 à 2

Aorte et artère pulmonaire vues, équilibrées et croisement sans particularités

Une veine pulmonaire vue

Aires pulmonaires :

Homogènes

Autre :

Diaphragme:

Gauche vue avec estomac en intra abdominal

Autre :

Paroi abdominale antérieure :

Le cordon semble inséré normalement

Autre :

Abdomen :

Estomac en place

Échogénicité intestinale habituelle

Autre :

Uro-génital :

2 Reins en place

Vessie visualisée

Sexe :

Autre :

Membres :

4 membres de 3 segments visualisés

Autre :

Rachis :

La partie lombo-sacrée du rachis semble d'aspect habituel, la moelle est
vue

Autre :

Annexes foetales :

Placenta:

Normalement inséré, localisation :

Aspect habituel

Position par rapport à une cicatrice de césarienne éventuelle :

Liquide amniotique :

quantité normale

oligoamnios

hydramnios

Index de liquide amniotique (ILA) : mm ; citerne max (PGC): mm.

Cordon ombilical : constitué de _____ artères et _____ veine

Col utérin : _____ mm , sans entonnoir

Conclusions :

Echographie du deuxième trimestre à SA et Jours .

Présentation céphalique autre :

Il n'a pas été mis en évidence d'anomalie morphologique au cours de cet examen

Les biométries correspondent à l'âge de grossesse

Autre(s) :

NB : iconographies obligatoires en annexe (9 clichés au minimum !)

pensez à ajouter un cliché montrant le bord inférieur du placenta / col

